17 noiembrie 2020

Lansarea strategiei globale OMS pentru eliminarea cancerului de col uterin

Strategia globală pentru eliminarea cancerului de col uterin

Adoptată printr-o rezoluție susținută de 194 de țări.

OBIECTIV 2030

Incidența sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.

Trei ținte esențiale ale strategiei OMS

- 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani



- 70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani



- 90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne



Adunarea Generală a OMS a adoptat strategia de accelerare a eliminării cancerului de col uterin până în 2030

CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

1. **Prevenirea prin vaccinare**
   Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului cervical.
2. **Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase**
   Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-canceroase în cancer.
3. **Tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv**
   Poate salva vieți!

*Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.


Vaccinare • Screening • Tratament



Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

17 noiembrie 2026

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI CERVICAL




Împreună putem elimina cancerul de col uterin!

Institutul Național de Sănătate Publică

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Material adresat populației generale

CE ESTE
cancerul de col uterin (cancerul cervical)?



Cancerul care apare în celulele colului uterin (partea inferioară a uterului care se conectează la vagin) din cauza înmulțirii necontrolate, haotice a unor celule anormale, cel mai frecvent .în prezența HPV.

CINE ESTE LA RISC de a dezvolta cancer cervical?

- ✓ Toate femeile care și-au început viața sexuală, sunt la risc de a dezvolta cancer cervical.
- ✓ Cel mai frecvent femei în vârstă de 35-44 ani

CE SIMPTOME ARE cancerul de col uterin?

- ✓ În mod obișnuit nu există simptome în stadiile precoce.
- ✓ Când apar, simptomele pot include:
  - ❖ Sângerări vaginale anormale
  - ❖ Scurgeri vaginale anormale
  - ❖ Durere la contactul sexual
- ✓ Aceste simptome apar și în alte afecțiuni , fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin.
- ✓ In cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!

CARE ESTE CAUZA cancerului de col uterin?

- ✓ Peste 90% din cazuri cauzate de infecția cu HPV
- ✓ HPV se transmite în special prin contact sexual
- ✓ 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții
- ✓ In majoritatea cazurilor infecția se va vindeca de la sine, și nu vor dezvolta niciodată cancer cervical.
- ✓ Uneori, infecția HPV persistentă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- ✓ Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- ✓ Intre infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- ✓ Infecția cu HPV nu prezintă simptome

CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT?

Da, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti HPV și screening!



Vaccinarea și screening-ul pot salva vieți!

Infectia HPV poate cauza și dezvoltarea cancerelor de:

- ✓ organe genitale (vagin, vulva sau penis), anus
- ✓ orofaringeale (cancere ale gurii, ale corzilor vocale).

INFECȚIA CU HPV poate fi tratată?

- ✓ Nu există tratament pentru infecția cu HPV,
- ✓ Pot fi tratate efectele produse de infecția HPV.

HPV nu înseamnă HIV

- ✓ Virusul Papilloma Uman (HPV) si Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) sunt viruși foarte diferiți
- ✓ HPV și HIV provoacă probleme de sănătate diferite.

VACCINAREA anti – HPV
pentru prevenirea cancerului de col uterin

- ✓ Vaccinul antiHPV oferă protecţie împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- ✓ Riscul de infecţie este la fel de mare în cazul fetelor şi al băieţilor.
- ✓ Momentul optim pentru vaccinare înaintea debutului activităţii sexuale (înaintea apariţiei riscului de infecţie HPV)

In România, vaccinarea anti HPV este:

- ✓ **gratuită pentru fete şi băieţi între 11 ani și 26 ani**
- ✓ **compensată 50% pentru femei între 27 ani și 45 de ani**

SCREENING-UL
pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

- ✓ Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani) pentru a depista dacă au leziuni precanceroase;
- ✓ Dacă apar leziuni precanceroase, pot fi tratate şi nu vor mai evolua către cancer, prevenind astfel apariţia cancerului de col uterin!

RECOMANDARI SCREENING

- ✓ Femei între 25-64 an: **testare primară HPV cu triaj citologic (examen Babeș-Papanicolau în cazul rezultatelor pozitive), efectuată o dată la 5 ani.**

Dacă aveți între 25 și 64 de ani adresați-vă medicului de familie sau medicului ginecolog pentru mai mult einformații privind screeningul cancerului de col uterin!

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare şi screening şi poate fi vindecat dacă este depistat la timp și tratat corespunzător!